

TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL CANCER DE MAMA

INFORME FINAL: RECURRENCIAS LOCOREGIONALES

MENCION HONORIFICA
"PREMIO ALEJANDRO CALVO LAIRET"

DR. CARLOS F. PACHECO SOLER *, DR. AUGUSTO TEJADA **, DR. GONZALO BARRIOS **,
DR. LEOPOLDO MORENO **, DR. ALBERTO CONTRERAS **, DR. RAMÓN PEREZ-BRETT **,
DRA. SARA MAISI ***, DR. ARLY ZAMBRANO ****, DRA. JOSEPMILLY PEÑA *****

RESUMEN: La cirugía conservadora más radioterapia es una alternativa a la mastectomía radical en los estadios tempranos del cáncer de mama, presentando tasas de sobrevida equivalentes. En el presente estudio presentamos los resultados del tratamiento conservador del cáncer mamario en estadios tempranos en el Servicio de Patología Mamaria del Hospital Oncológico "Padre Machado". Son evaluadas 138 pacientes a quienes se les realizó una Mastectomía Parcial Oncológica más disección axilar y radioterapia postoperatoria. La tasa de sobrevida global actuarial a los 5 y 10 años fue del 85% y 74%, la tasa de sobrevida actuarial libre de enfermedad a los 5 y 10 años fue 66% y 59%. La incidencia de recurrencias locales fue del 16,63% (23/138), con una tasa de sobrevida a los 5 años del 62%, y la cual, es comparable a la tasa de sobrevida libre de enfermedad de todo el grupo de pacientes. No se presentaron recurrencias axilares. Los factores de riesgo estadísticamente significativos ($P < 0,05$), para la presentación de recurrencias locales fueron: edad menor de 40 años, tamaño tumoral mayor de 2 cm, bajo grado de diferenciación histológica, márgenes positivos, receptores estrogénicos negativos y más de 4 ganglios axilares metastásicos. La tasa de metástasis a distancia fue del 22,46% (31/138). Solo 6 pacientes (4,35%), presentaron metástasis en forma sincrónica con las recurrencias locales.

INTRODUCCION:

Hace aproximadamente 15 años se inició en el Servicio de Patología Mamaria del Hospital Oncológico "Padre Machado", el Protocolo de Cirugía Preservadora del Cáncer de Mama en Estadios Tempranos.

En comunicaciones preliminares^(1, 2), se han dado a conocer los resultados parciales del seguimiento de estas pacientes. En el presente informe presentamos los resultados a largo plazo de las pacientes sometidas a este protocolo.

Numerosos estudios han demostrado que las pacientes tratadas con cirugía preservadora más radioterapia adyuvante presentan tasas de sobrevida similares a las observadas con la mastectomía radical y con la mastectomía radical modificada⁽³⁻⁷⁾, pero, aun existen controversias sobre significado de las recurrencias locoregionales en la tasa de sobrevida global en las pacientes tratadas con cirugía conservadora.

* Cirujano General, Cirujano Oncólogo, HOPM, MASVC, MASVO, MASVM.

** Cirujano General, Cirujano Oncólogo, Servicio de Patología Mamaria, HOPM, MASVC, MASVO, MTSVM.

-** Médico Patólogo, Servicio de Anatomía Patológica, HOPM.

**** Cirujano General, Residente de Cirugía Oncológica, HOPM, MASVC

***** Médico Cirujano, Ex-Interno de Pre-Grado, Hospital Oncológico "Padre Machado".